Mathématiques pour l'intelligence artificielle (MIA)

M2 IAAA, AMU, 2021-2022

Thomas Schatz

Plan du cours

1. Introduction générale
2. Preuves (revue)
3. Algèbre linéaire (revue)
4. Optimisation (revue)
5. Optimisation sous contraintes
6. Probabilités (revue)
7. Statistique
- 8. Théorie de l'apprentissage**
- 9. Optimisation pour l'apprentissage**

Partie 3 – Algèbre linéaire (revue)

Orthogonalité

Intérêt ?

Soit E un espace vectoriel de dimension finie n muni d'un produit scalaire $(\cdot | \cdot)$ et $V = (v_1, \dots, v_n)$ une base orthonormale de E . Alors, pour tout $v \in E$,

$$v = \sum_{i=1}^n (v | v_i) v_i.$$

Orthogonalité

Comment construire des familles orthonormales?

Gram-Schmidt procedure : étant donné k vecteurs indépendants $(a_1, a_2, \dots, a_k) \in E^k$, trouver des vecteurs orthonormaux $(q_1, q_2, \dots, a_k)$, tels que pour tout $r \leq k$, $(q_1, q_2, \dots, q_r)$ soit une base orthonormale de $\text{Vect}(a_1, a_2, \dots, a_r)$

- step 1a. $\tilde{q}_1 := a_1$
- step 1b. $q_1 := \tilde{q}_1 / \|\tilde{q}_1\|$ (normalize)
- step 2a. $\tilde{q}_2 := a_2 - (q_1^T a_2)q_1$ (remove q_1 component from a_2)
- step 2b. $q_2 := \tilde{q}_2 / \|\tilde{q}_2\|$ (normalize)
- step 3a. $\tilde{q}_3 := a_3 - (q_1^T a_3)q_1 - (q_2^T a_3)q_2$ (remove q_1, q_2 components)
- step 3b. $q_3 := \tilde{q}_3 / \|\tilde{q}_3\|$ (normalize)
- etc.

Orthogonalité

Gram-Schmidt et factorisation QR

$$\underbrace{\begin{bmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_k \end{bmatrix}}_A = \underbrace{\begin{bmatrix} q_1 & q_2 & \cdots & q_k \end{bmatrix}}_Q \underbrace{\begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & \cdots & r_{1k} \\ 0 & r_{22} & \cdots & r_{2k} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & r_{kk} \end{bmatrix}}_R$$

k : rang de la matrice A

$$r_{ij} = q_i^T a_j \quad \text{Calculé durant Gram-Schmidt}$$

Une matrice est dite semi-orthogonale si ces colonnes sont orthonormales.

Si Q est une matrice semi-orthogonale de taille $m \times k$, alors $Q^T Q = I_k$

Une matrice semi-orthogonale carrée est dite orthogonale.

Transposée

Transposée de A : obtenue en échangeant les lignes et les colonnes de A

$$(A + B)^T = A^T + B^T, \quad (\alpha A)^T = \alpha A^T$$

$$(AB)^T = B^T A^T$$

Matrice par blocs

La matrice

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 4 & 4 & 4 \\ 3 & 3 & 4 & 4 & 4 \\ 3 & 3 & 4 & 4 & 4 \end{bmatrix}$$

peut être partitionnée en quatre blocs

$$\mathbf{P}_{11} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \mathbf{P}_{12} = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \end{bmatrix}, \mathbf{P}_{21} = \begin{bmatrix} 3 & 3 \\ 3 & 3 \\ 3 & 3 \end{bmatrix}, \mathbf{P}_{22} = \begin{bmatrix} 4 & 4 & 4 \\ 4 & 4 & 4 \\ 4 & 4 & 4 \end{bmatrix}.$$

On peut alors écrire la matrice par bloc comme :

$$\mathbf{P}_{\text{partitionnee}} = \begin{bmatrix} \mathbf{P}_{11} & \mathbf{P}_{12} \\ \mathbf{P}_{21} & \mathbf{P}_{22} \end{bmatrix}.$$

Interpretation des opérations matricielles

write $A \in \mathbf{R}^{m \times n}$ in terms of its columns:

$$A = \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n \end{bmatrix}$$

then $y = Ax$ can be written as

$$y = x_1 a_1 + x_2 a_2 + \cdots + x_n a_n$$

write A in terms of its rows:

$$A = \begin{bmatrix} \tilde{a}_1^T \\ \tilde{a}_2^T \\ \vdots \\ \tilde{a}_n^T \end{bmatrix}$$

then $y = Ax$ can be written as

$$y = \begin{bmatrix} \tilde{a}_1^T x \\ \tilde{a}_2^T x \\ \vdots \\ \tilde{a}_m^T x \end{bmatrix}$$

Interpretation des opérations matricielles

$$c_{ij} = \tilde{a}_i^T b_j = \langle \tilde{a}_i, b_j \rangle$$

$$C = [c_1 \cdots c_p] = AB = [Ab_1 \cdots Ab_p]$$

$$C = \begin{bmatrix} \tilde{c}_1^T \\ \vdots \\ \tilde{c}_m^T \end{bmatrix} = AB = \begin{bmatrix} \tilde{a}_1^T B \\ \vdots \\ \tilde{a}_m^T B \end{bmatrix}$$

$$C = \sum_i a_i \tilde{b}_i^T$$

Décomposition en valeurs singulières

Etant donné une matrice rectangulaire quelconque

(à coefficients réels)

$$A = \begin{pmatrix} a_{1,1} & \dots & a_{1,n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m,1} & \dots & a_{m,n} \end{pmatrix}$$

Quelle transformation linéaire représente-t-elle ?

Décomposition en valeurs singulières

$$AV = U\Sigma \quad A \begin{bmatrix} v_1 & \dots & v_r & \dots & v_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_1 & \dots & u_r & \dots & u_m \end{bmatrix} \left[\begin{array}{ccc|c} \sigma_1 & & & 0 \\ & \ddots & & \\ & & \sigma_r & \\ \hline & & & 0 \end{array} \right]$$

Décomposition en valeurs singulières

$$AV = U\Sigma \quad A \begin{bmatrix} v_1 \dots v_r \dots v_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_1 \dots u_r \dots u_m \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sigma_1 & & & | & 0 \\ & \ddots & & & \\ & & \sigma_r & & \\ \hline & & & & 0 \end{bmatrix}$$

Theorème spectral

Si S est une matrice symétrique, réelle de taille $m \times m$, alors il existe une matrice orthogonale réelle Q de taille $m \times m$ et une matrice diagonale réelle Λ de taille $m \times m$ telles que $S = Q\Lambda Q^T$.

Une matrice symétrique réelle est dite définie positive, noté $S \succ 0$ ssi pour toute matrice colonne u , $u^T S u > 0$.

Une matrice symétrique réelle est dite semi-définie positive, $S \succeq 0$, ssi pour toute matrice colonne u , $u^T S u \geq 0$.

Relation d'ordre sur les matrices symétriques réelles:

$$S_1 \prec S_2 \text{ ssi } S_2 - S_1 \succ 0$$

et

$$S_1 \preceq S_2 \text{ ssi } S_2 - S_1 \succeq 0$$

Diagonalisation

Soit A une matrice à coefficients réels de taille $m \times m$. $\lambda \in \mathbf{C}$ est une valeur propre de A ssi il existe $v \in \mathbf{C}^m$, non-nul, tel que $Av = \lambda v$, i.e. l'image de v par A est dans la même direction que v . Un tel v est appelé un vecteur propre de A associé à la valeur propre λ .

suppose $v_1, \dots, v_n$ is a *linearly independent* set of eigenvectors of $A \in \mathbf{R}^{n \times n}$:

$$Av_i = \lambda_i v_i, \quad i = 1, \dots, n$$

express as

Diagonalisation

$$A \begin{bmatrix} v_1 & \cdots & v_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_1 & \cdots & v_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1 & & \\ & \cdots & \\ & & \lambda_n \end{bmatrix}$$

define $T = \begin{bmatrix} v_1 & \cdots & v_n \end{bmatrix}$ and $\Lambda = \mathbf{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$, so

$$AT = T\Lambda$$

and finally

$$T^{-1}AT = \Lambda$$

Forme canonique de Jordan

any matrix $A \in \mathbf{R}^{n \times n}$ can be put in *Jordan canonical form* by a similarity transformation, *i.e.*

$$T^{-1}AT = J = \begin{bmatrix} J_1 & & \\ & \cdots & \\ & & J_q \end{bmatrix}$$

where

$$J_i = \begin{bmatrix} \lambda_i & 1 & & \\ & \lambda_i & \cdots & \\ & & \cdots & 1 \\ & & & \lambda_i \end{bmatrix} \in \mathbf{C}^{n_i \times n_i}$$

is called a *Jordan block* of size n_i with eigenvalue λ_i (so $n = \sum_{i=1}^q n_i$)

Determinant et trace

A matrice carrée $m \times m$

$$\det(A) = \sum_{\sigma \in \mathcal{S}_n} \left(\operatorname{sgn}(\sigma) \prod_{i=1}^n a_{i, \sigma_i} \right),$$

$\operatorname{sgn}(\sigma)$ est la parité du nombre d'éléments dans une décomposition de σ en une séquence de transpositions (échange de deux éléments).

$$\det(AB) = \det(A) \det(B)$$

$$\operatorname{Tr}(A) = \sum_{i=1}^m a_{i,i}$$

$$\operatorname{Tr}(AB) = \operatorname{Tr}(BA)$$

Crédits

Certaines figures de

- Strang, Gilbert. *Linear algebra and learning from data*. Cambridge: Wellesley-Cambridge Press, 2019
- Boyd, Stephen EE263 - Introduction to Linear Dynamical Systems (<https://see.stanford.edu/Course/EE263>)
- Wikipedia